



BIOPON Karton 3 kg do iglaków przeciw brązowieniu igieł

Cena brutto	36,90 zł
Cena netto	34,17 zł
Numer katalogowy	1056
Kod EAN	5904517048720

Opis produktu

BIOPON do iglaków przeciw brązowieniu igieł

Najczęstszą przyczyną brązowienia drzew i krzewów iglastych jest niedobór składników pokarmowych w podłożu. Niedoborom tym można w łatwy sposób zapobiegać stosując nawóz BOPON do iglaków przeciw brązowieniu igieł. Specjalnie dobrane proporcje magnezu i siarki w pełni pokrywają zapotrzebowanie roślin na te pierwiastki, eliminując przyczynę brązowienia igieł. Dodatkowo nawóz zakwasza fizjologicznie glebę, co korzystnie wpływa na iglaki. Rośliny stają się znowu zielone i zdrowe. Najlepszym momentem na rozpoczęcie nawożenia jest pojawienie się pierwszych objawów brązowienia igieł lub potrzeba zakwaszenia gleby.

UWAGA: Brunatnienie igieł może być również spowodowane chorobami grzybowymi oraz przez szkodniki, którym nie przeciwdziała żaden nawóz. W takich przypadkach konieczne jest zastosowanie środków ochrony roślin.

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Odmierzyć zalecaną dawkę
2. Równomiernie rozprowadzić nawóz wokół rośliny
3. Wymieszać granulaty z górną warstwą ziemi
4. Podlać roślinę, aby od razu uaktywnić substancje zawarte w nawozie

Dawkowanie: Zalecana dawka nawozu zależy od wielkości rośliny i sposobu nawożenia.

POSYPYWANIE: Stosować od wczesnej wiosny do późnej jesieni, 3 - 4 razy w sezonie, nie częściej niż co 2 tygodnie.

Zalecana dawka w zależności od wielkości rośliny:

- do 1 m - 25 g/m²
- 1 - 2 m - 50 g/m²
- 2 - 5 m - 100 g/m²
- >5 m - 150 g/m²

OPRYSK: Od wczesnej wiosny do późnej jesieni, stosować 3 - 4 razy w sezonie, nie częściej niż co 2 tygodnie. Oprysk najlepiej wykonać rano lub wieczorem.

Przygotowanie roztworu: 500 g nawozu rozpuścić w 10 l wody - 50 - 100 ml / m wysokości rośliny

Nie należy przekraczać zalecanych dawek nawozu, ponieważ mogłoby to spowodować uszkodzenie lub zniszczenie roślin.

Kalendarz stosowania na opakowaniu.

Cena dotyczy 1op/3kg