



## BROS Vitrol GB zwalcza ślimaki trutka 1 kg

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>39,90 zł</b>      |
| Cena netto       | <b>36,94 zł</b>      |
| Numer katalogowy | <b>1941</b>          |
| Kod EAN          | <b>5904517321830</b> |

### Opis produktu

#### VITROL GB ZWALCZA ŚLIMAKI

- skutecznie zwalcza ślimaki nagie i oskorupione
- odporny na deszcz, nie działa szkodliwie na ptaki, psy i inne zwierzęta domowe
- do stosowania w rolnictwie ekologicznym

**MOLUSKOCYD** w formie granulatu - przynęty gotowej do użycia (RB), przeznaczony do zwalczania ślimaków nących i oskorupionych. Dzięki specjalnie dobranej przynęcie skutecznie wabi ślimaki i jest przez nie chętnie zjadany.

Mechanizm działania substancji czynnej środka - pirofosforanu żelaza, polega na redukcji wydzielania śluzu przez ślimaki. Środek powoduje natychmiastowe zahamowanie żerowania ślimaków na uprawach - już po jednokrotnym spożyciu środka szkodniki tracą apetyt i zaprzestają uszkodzania roślin. Po spożyciu granул ślimaki zazwyczaj chowają się w glebie / podłożu, gdzie giną, dzięki czemu na chronionym obszarze nie widać śluzu i martwych ślimaków. Z tego względu efekty stosowania środka mogą nie być widoczne od razu i skuteczność środka należy mierzyć pośrednio - mniejszym rozmiarem szkód wyrządzonych przez szkodniki. Środek zawiera substancję czynną ulegającą rozkładowi na jony fosforanowe i jony żelaza, które naturalnie występują w glebie.

Preparat może być stosowany w obecności zwierząt domowych, ptaków i jeży.

**UWAGA: Pełna informacja o sposobie użycia znajduje się na opakowaniu. Należy zapoznać się z informacjami z etykiety przed zastosowaniem produktu.**

Środek rozsypywać równomiernie za pomocą aplikatora do granulowanych środków ochrony roślin.

#### **Truskawka i inne rośliny sadownicze (w uprawie polowej, szklarniowej i pod osłonami)**

Ślimaki nagie, ślimaki oskorupione.

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7 g/10 m<sup>2</sup>

Termin stosowania: Środek stosować po rozpoczęciu wegetacji lub po posadzeniu roślin i w późniejszym okresie wegetacji, natychmiast po pojawieniu się szkodników lub po zaobserwowaniu pierwszych szkód wyrządzonych przez szkodniki.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (cykl uprawy): 6

Odstępy między zabiegami: co najmniej 14 dni.

#### **Aksamitka, funkia i inne rośliny ozdobne (w uprawie polowej, w uprawie szklarniowej i pod osłonami)**

Ślimaki nagie

Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 25 g/10 m<sup>2</sup>

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 12-25 g/10 m<sup>2</sup>

Termin stosowania: Środek stosować przed wschodami (BBCH 00) lub po wschodach lub po posadzeniu roślin i w późniejszym okresie wegetacji, natychmiast po pojawieniu się szkodników lub po zaobserwowaniu pierwszych szkód wyrządzonych przez szkodniki.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (cykl uprawy): 6

Odstępy między zabiegami: co najmniej 14 dni.

**Informacja o środkach ostrożności, okresie karencji i szczególnych warunkach stosowania na etykiecie.** Na opakowaniu znajdują się także informacje o środkach ostrożności dla osób stosujących środek, środkach ostrożności związanych z ochroną środowiska naturalnego oraz warunkach przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony

---

roślin i opakowania.

**ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ:**

**Pirofosforan żelaza - 24g/kg (2,4%)**

**Uwaga:**

- Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa.
- Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
- Opakowanie zawiera środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

**Nabycia środków ochrony roślin poprzez zawarcie umowy na odległość mogą dokonywać jedynie osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013r.**

Cena dotyczy 1szt/ 1kg